

Don de sang, partenaires multiples et relations sexuelles anales

De quoi dois-je tenir compte au sujet des partenaires sexuels multiples lors du don de sang?

Le risque de contracter des infections transmissibles sexuellement comme le VIH ou l'hépatite C augmente avec les nouveaux partenaires sexuels ou les partenaires sexuels multiples. On demande aux donneurs de sang s'ils ont eu de nouveaux partenaires sexuels ou plusieurs partenaires sexuels au cours des trois derniers mois.

Si la réponse est oui, on demande aux donneurs : « **Avez-vous eu des relations sexuelles anales au cours des trois derniers mois?** »

Si vous avez eu des relations sexuelles anales avec le même partenaire pendant au moins trois mois ou si vous

n'avez pas eu plusieurs partenaires pendant cette période, vous pouvez poursuivre le processus de don.

Si vous avez eu des relations sexuelles anales avec de nouveaux partenaires ou plusieurs partenaires, vous devez attendre trois mois à compter de la dernière relation pour faire un don. Cette période d'attente réduit le risque que des infections récentes ne soient pas détectées lors du dépistage.

Qu'en est-il des relations polyamoureuses lors du don de sang?

Selon les critères d'admissibilité des donneurs, il n'y a actuellement pas de distinction entre les nouveaux partenaires et les partenaires multiples à long terme.

Si vous avez eu des relations sexuelles anales avec un ou plusieurs partenaires au cours des trois derniers mois, vous devrez attendre trois mois avant de faire un don.

Pourquoi les relations sexuelles anales sont-elles un point de mire pour le dépistage du comportement sexuel?

Les relations sexuelles anales passives comportent un risque plus élevé de transmission du VIH par acte que les autres activités sexuelles. Les questions de dépistage sur les relations sexuelles anales aident à assurer la sécurité en réduisant les risques globaux.



Pour en savoir plus,
consultez le site **blood.ca**

